inO GREEN - N

AVEC URÉE FORMALDÉHYDE SOUFRE ET MAGNÉSIE

ENGRAIS CE - Engrais azoté en solution contenant S et MgO

COMPOSITION

N	300 g/L
MgO	33 g/L
SO_3	67 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Formulation	**Solution hautement concentrée**
Utilisation	**Foliaire**
Conditionnement	10 L (palette 600L) - Fût 200 L - Cuves 600 L et 1000 L
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel
Conservation du produit	18 mois
Effet acidifiant sur la bouillie	pas d'effet
Forme	Liquide - (SL)
Densité	1,29

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

Rôles des éléments

Rôle de l'Azote :
- Constituant essentiels des protéines
- Rôle enzymatique
- Photosynthèse

Facteurs de riques :
- Temps froids et humides
- Sécheresse
- Fort taux de matière organique

Caractéristiques

inO GREEN - N est un produit azoté à libération progressive, par son action rapide et durable, il est la solution azotée qui permet de répondre aux apports de fin de cycle.

inO GREEN - N est une formulation liquide unique, prête à l'emploi et stabilisée.
inO GREEN - N, Avantages :
-> Soluble et compatible avec la plupart des produits de traitements phytosanitaires.
-> Sans risques d'aggressivité sur le feuillage.
-> Réduit les pertes par volatilisation.
-> Assure une meilleure pénétration foliaire et permet une réduction des pertes par lessivage.

Intérêts de la formulation

2 Formes d'Azote :

-> 33% de l'azote apporté est sous forme d'azote retard (urée formaldéhyde) pour une absorption rapide mais avec une dégradation et une libération lente de l'azote dans la plante.

-> 67% de l'azote apporté est sous forme d'urée pour une assimilation et une utilisation rapide par la plante.

Cette formulation spécifique permet d'apporter de l'azote par voie foliaire avec simplicité, sécurité et efficacité.

MODE D'EMPLOI

Principales cultures		Doses /ha	Périodes d'application
	Céréales	15-20 L*	de dernière feuille jusqu'au stade épiaison
	Maïs	15-20 L**	de 4 à 6 feuilles et 10-15 jours plus tard si nécessaire
	Pommes de terre	10-20 L**	3 à 4 applications à partir de début tubérisation puis tous les 15 jours
	Betteraves	10-20 L*	de 4 à 6 feuilles et 1 mois plus tard si nécessaire

Principales cultures		Doses /ha	Périodes d'application
	Tournesol	15-20 L*	de 5 à 6 paires de feuille jusqu'à l'apparition du bouton floral.
	Colza	15-20 L*	de 4-8 feuilles puis stade début montaison jusqu'à la fin du stade boutons accolés.
	Arbres fruitiers	5-10 L**	Soutien nutritif - Dose /ha 5-10 L *** - Stades : 1 - 2 applications à partir de l'apparition des premières feuilles (ne pas traiter pendant la floraison). Mise en réserve - post-récolte - Dose /ha 5-10 L *** Stades : 1 application après cueillette et avant début chute des feuilles.
	Vigne	5-10 L***	Soutien nutritif - Dose /ha 5-10 L ** - Stades : 2 applications à partir du stade feuilles étalées jusqu'au stade boutons floraux séparés (avant floraison). Amélioration de la teneur en azote des moûts - Dose / ha 20 L ** - Stades : 2 applications en encadrement de la véraison à 15 jours d'intervalle.

* Volume d'eau minimum de 100 L/ha - ** Volume d'eau conseillé de 200 L/ha - *** Volume d'eau conseillé de 500 L/ha

CONSEILS PRATIQUES

Préparation de la bouillie

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau / ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur l'ensemble du feuillage sans ruissellement. Préférer les traitements aux températures comprises entre 6 et 25 °C.
- Agiter le bidon pour homogénéisation.
- Verser progressivement le produit, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche.
- Rincer l'emballage deux fois.

En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit en dernier.

inO NUTRITION